

予防接種表 (大人) IMMUNIZATION SCHEDULE FOR ADULT 2018年3月13日更新



- インドネシアに在住される方は A、B型肝炎 腸チフス 破傷風 インフルエンザ、狂犬病ワクチンをお勧めします。
- 国によりワクチン接種の時期、回数異なります。各種混合ワクチンも取り扱っております。
- 診察の際は今までの接種記録をお持ち下さい。

Disease / 予防接種名	Vaccine / ワクチン	Time of Administration / 接種回数					
		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	追加接種/ 備考
Hepatitis A / A型肝炎	Havrix 1440 (SKB)	初回	6~12カ月後				7~10年毎
	Avaxim 160 (sanofi)	初回	6~12カ月後 (2-15歳は6カ月後)				
Hepatitis B / B型肝炎	Engerix B / H-B VAX II	初回	1カ月後	初回より6カ月後			3~5年毎
Hepatitis A + B A + B型肝炎混合	Twinrix(GSK)	初回	1カ月後	初回より6カ月後			5年毎
Typhoid Fever / 腸チフス	Thypim Vi(AP)	1回のみ					3年毎
Tetanus / 破傷風	Tetanus Toxoid (Bio Farma)	初回	4週間後	2回目より6~12カ月後	(10年以内に接種した場合は要相談)		10年毎
DPT / DT Diphtheria-Pertussis-Tetanus ジフテリア (百日咳) 破傷風	Td/ Tdap	初回	4週間後	2回目より2~12カ月後	(回数は要相談)		10年毎
MMR (Measles-Mumps-Rubella) 麻疹,流行性耳下腺炎,風疹	MMR II (MSD) TRIMOVAX(sanofi)	初回	28日後 (旅行者,医療従事者)				
Influenza 季節性インフルエンザ	Vaxigrip (AP) Fluquadri(sanofi)	1回のみ					1年毎
Japanese Encephalitis 日本脳炎	IMOJEV(sanofi) 日本製との互換性なし	初回	初回より 12-24カ月後				
Human Papilloma Virus 子宮頸がん	Gardasil (4価)	初回	2カ月後	初回より6カ月後			9歳以上
	Cervarix (2価)	初回	1- 2.5カ月後	初回より5-12カ月後			10歳以上
Rabies / 狂犬病	Verorab (sanofi) Rabipur(GSK) 日本製とは異なる	初回 (予防接種)	7日目	21- 28日目			1年後 その後5年毎
		初回 (噛まれた場合)	3日目	7日目	14日目	28日目 オプション	適宜免疫グロブリン を接種
Varicella / 水痘	Varilrix(GSK)	初回	4-8週間後				
Pneumococcal / 肺炎球菌	Pneumovax 23	1回または2回					
Meningococcal Meningitis / 髄膜炎 菌性髄膜炎	Mencevax / Menveo	1回のみ					5年毎
Yellow Fever / 黄熱病	Available in Airport 空港で可能	1回のみ (10日後より有効)					

予防接種表 (小児) IMMUNIZATION SCHEDULE FOR CHILDREN 2018年3月13日更新



- 国によりワクチン接種の時期、回数は異なります。各種混合ワクチンも取り扱っております。
- 接種方法は、今までのワクチン接種歴、滞在期間等を医師が伺った上で判断いたします。
- 診察の際は母子手帳をお持ち下さい。

	Vaccine / ワクチン		Month / 月齢												Year / 年齢					追加接種/ 備考
			0	1	2	4	6	9	12	15	18	24	3	5	6	10	12			
Tuberculosis / BCG	BCG baby (BioFarma)	生	1																	
Hepatitis A / A型肝炎	Havrix Junior TM 720 (SKB)	不活化										初回1歳以降 2回目は6-12ヵ月後					7~10年毎			
	Avaxim 80 U pediatric (sanofi)	不活化										初回2歳以降 2回目は6-18ヵ月後								
Hepatitis B / B型肝炎	Engerix B PAEDIATRIC (GSK)	不活化	1	2			3											3~5年毎		
Hepatitis A+B A+B型肝炎混合	Twinrix(GSK)	不活化										初回2歳以降 2回目は6-12ヵ月後					5年毎			
DPT (Diphtheria-Pertussis-Tetanus) ジフテリア、百日咳、破傷風	Infanrix (GSK) DPT (BioFarma)インドネシア製	不活化			1	2	3					4				5		インドネシアで推奨される接種方法 日本からの続きは医師に確認		
Tdap (Tetanus-Diphtheria-Pertussis) 破傷風-ジフテリア-百日咳 (4歳以上)	boostrix®(GSK)	不活化																4歳以上のDPT追加接種で使用。 ジフテリアを減らし局所反応が少ない		
4種混合 4 in 1 DPT+HIB (日本の4種混合はDPT+ポリオで、 インドネシアとは異なります)	Infanrix HIB (GSK)	不活化																		
5種混合 5 in 1 DPT+HIB+ポリオ	Infanrix-IPV+HIB (GSK) Pediaceel (sanofi)	不活化																		
6種混合 6 in 1 DPT+HIB+ポリオ+B型肝炎	Infanrix HEXA (GSK) HEXAXIM(sanofi)	不活化																		
Polio / ポリオ	Imovax(Avebts) (IPV) 注射	不活化			1	2						3				4				
Haemophilus Influenzae B インフルエンザB型菌 (ヒブ)	Act-HIB (sanofi) HIBERIX (GSK)	不活化			1	2	3				4							6ヶ月未満で開始:計4回 6-12ヵ月:計3回 1-5歳:1回		
Pneumococcal Disease/肺炎球菌	Prevenar13 (pfyzer)	不活化			1	2	3				4									
Varicella / 水痘 (みずぼうそう)	Varilrix(GSK) VARIVAX(MSD)	生									生後12ヶ月から12歳までの間 1回									
MMR (Measles-Mumps-Rubella) 麻疹、流行性耳下腺炎(おたふく)、風疹 (日本のMRは扱っておりません)	MMR II (MSD) TRIMOVAX(sanofi)	生									1					2		卵アレルギーは要相談		
Measles / 麻疹 (はしか)	Measles(BioFarma)	生						1								2				
Rotavirus / ロタウイルス	Rotarix(GSK) 内服 2回 RotaTeq(MSD)内服 3回	生			1	2	(3)				2回または3回									
Influenza/ 季節性インフルエンザ	Vaxigrip (AP) Fluquadri(sanofi)	不活化									6ヶ月以上9歳以下で初回の場合は2回接種					1回のみ	1年毎 卵アレルギーは要相談			
Japanese Encephalitis 日本脳炎	IMOJEV(sanofi) 日本製との互換性なし	生									生後12ヶ月から。12-24ヵ月後に追加									
Typhoid / 腸チフス	Typhim Vi(AP)	不活化													1			3年毎		
Rabies / 狂犬病	Verorab (sanofi) Rabipur(GSK) 日本製とは異なる	不活化									予防接種は3回接種 (初回、7日目、21-28日後) 噛まれた場合は4-5回接種 (0,3,7,14日目 (必要時28日目))+適宜免疫グロブリン					1年後 その後5年毎				
Yellow Fever / 黄熱病	Available in Airport 空港	生									1									
Meningococcal Meningitis 髄膜炎	Mencevax ACWY MENVEO	不活化													1			2年毎		